


AMARRE 800

FERTILIZANTE FOLIAR DE ALTO RENDIMIENTO

FERTILIZANTE FOLIAR / POLVO SOLUBLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
Nitrógeno Disponible (N)	12.05
Fósforo Disponible (P ₂ O ₅)	60.03
Boro (B)	5.08
Zinc (Zn)	5.10
Acondicionadores	17.74
Total	100.00

REG: RSCO-0141/VIII/00



AMARRE® 800 es un fertilizante foliar en polvo compuesto principalmente de Fosforo, complementado con Nitrógeno, Boro y Zinc. Está diseñado con un alto contenido de Fósforo para cubrir las necesidades por la planta de este nutriente.

Por su contenido, **AMARRE® 800** favorece el crecimiento del cultivo, así como la fotosíntesis, la división y crecimiento de células; también ayuda al desarrollo de raíces, el estímulo de la floración y la formación de semillas. Puede ser aplicado vía foliar de acuerdo a un programa de la nutrición balanceado.

CULTIVOS	DOSIS	OBSERVACIONES
Brócoli, Chile, Col, Coliflor, Fresa, Tomate, Papa.	1.5 a 3.0 Kg/Ha	Iniciar las aplicaciones 15 días antes de la floración o la formación del estolón en Papa. Repetir cada 8 días posteriormente. Cada 21 días en el caso de la fresa.
Chayote, Melón, Pepino, Sandía.	2.0 a 3.0 Kg/Ha	Aplicar 8 días antes de la floración y repetir cada 15 días durante la floración y desarrollo de frutos.
Cacahuete, Frijol, Frijol ejotero, Garbanzo, Haba, Jícama, Soya.	1.5 a 3.0 Kg/Ha	Aplicar al inicio de la floración y repetir al inicio de la formación de vainas.
Algodon, Gramíneas (arroz, avena, cebada, centeno, maíz, sorgo, trigo).	1.5 a 3.0 Kg/Ha	En el caso de Algodón aplicar en el cuadro al inicio de la floración y durante la formación de las bellotas; en las Gramíneas aplicar al inicio del amacollamiento y en el estado de grano lechoso.
Aguacate, Berries (arándano, frambuesa, zarzamora), Cítricos (limón persa, limón mexicano, naranja), Mango, Papayo, Plátano.	300 a 800g /100 L de agua	Aplicar al inicio de la floración y repetir durante el desarrollo de frutos.
Hortalizas y ornamentals (Producidos en invernadero o casa sombra)	2.0 a 4 Kg/Ha	Aplicar desde el inicio del desarrollo vegetativo hasta el desarrollo inicial de frutos; en el caso de ornamentales aplicar en la etapa del inicio de la floración.

FORMAS DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

En un recipiente realice una pre mezcla del producto con un poco de agua, agregue la cantidad de **AMARRE® 800** a utilizar y agite. Vacíe la pre mezcla en el tanque del equipo aspersor y después la cantidad de agua necesaria.

COMPATIBILIDAD

AMARRE® 800 es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de usarse. No es compatible con productos de fuerte reacción alcalina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

1. NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
2. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.
3. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
4. LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
5. NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y PIEL.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE

- Respete las recomendaciones de uso del producto.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.
- Respete las buenas prácticas agrícolas.
- No tire los envases y empaques vacíos del producto en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- Ni vierta el remanente del producto o agua de lavado del equipo de aplicación en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- Respete las dosis y épocas de aplicación del producto.

AMARRE® 800 se envasa en presentaciones de 1 Kg.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU INGENIERO AGRÓNOMO ASESOR.

NAY-CHEM, S.A. de C.V. solamente se responsabiliza de la formulación correcta y el contenido neto del producto. Dado que el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de los productos, están fuera de nuestro control, NAY-CHEM, S.A. de C.V. no se hace responsable del uso y resultado de los mismos.