FICHA TÉCNICA







REGULADOR DE CRECIMIENTO VEGETAL. POLVO SOLUBLE.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA % EN PESO Ácido Giberélico (A.G.3) 10.00
Ingredientes Inertes 90.00
Total 100.00

REG: RSCO-0214/X/00

ACTIVAR ® está basado en Acido Giberélico (A.G.3) el cual es un fito regulador de crecimiento de acción hormonal que estimula y regula el desarrollo de las plantas. Provocando la división y elongación celular. Así como el desarrollo y cuajado de frutos.

La respuesta fisiológica de los cultivos tratados dependerá del estado de desarrollo en que se encuentran. Actúa como raleador o bien, como precursor del crecimiento en diversas variedades de uva de mesa y cerezas.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS*	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Fresa	2 Frascos	Aplicar 15 días antes de la floración. O cuando se tenga escasa floración y desarrollo en la planta.
Chile	1Frasco	Aplicar una semana antes del trasplante, una semana después del mismo o antes de la floración.
Cebolla	1Frasco	Aplicar en el almacigo cuando las plántulas tengan de 1.0 a 1.5 cm., continuar una semana antes o después del trasplante.
Tomate de Cáscara	2 Frascos	Aplicar de 15 a 20 días después de emergido el cultivo y repetir a los 20 días después.
Frijol Ejotero	1Frasco	Aplicar 15 días después de emergido y antes de la floración.
Vid	2 Frascos	Aplicar al inicio de la floración y cuando las bayas tengan de 2 a 5 mm.
Melón y Sandía	2 Frascos	Al inicio de la floración en aplicaciones dirigidas al fruto de 2-3 semanas antes de la cosecha.
Apio y Berenjena	2 Frascos	Al inicio de la floración.
Cilantro y Perejil	1Frasco	Al inicio de la floración.
Col	1Frasco	Alrededor de 15 días después del trasplante 15.
Alfafa	2 Frascos	Aplicar a los 10 -15 días antes de cada corte.
Papa	2 Frascos	Sumergir durante 10 minutos los tubérculos a "sembrar" en una hectárea en una mezcla de Activar más agua.
Ornamentales (Clavel,	2 Frascos	Aplicar a partir de que las plantas tengan 15 cm de altura, repetir cada 2 meses.
Crisantemo, Rosal)		
OTRAS APLICACIONES		
TRATAMIENTO PRE COSECHA DE CÍTRICOS		Dosis: 10 mg/L. Aplicado 30 días antes de la cosecha, para contrarrestar la senescencia, el cambio de coloración y la pérdida de textura de los frutos una vez cosechados.
GERMINACIÓN DE SEMILLAS		Para activar la germinación asperjando una solución 10 mg /L sobre la semilla a germinar.

^{*}Número de frascos de 14 g de ACTIVAR diluidos en volumen de 200 L de agua como mínimo.





FORMAS DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de aplicación calibrado, vierta el producto a la dosis recomendada, directamente en el agua de aspersión, agitando levemente. Realice la aplicación por la mañana procurando cubrir bien el follaje, ACTIVAR [®] puede ser empleado dentro de un programa de fertilización y/o fitosanitario, agregándolo primero al tanque de aspersión.

COMPATIBILIDAD

ACTIVAR ® es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de usarse.

FITOTOXICIDAD

ACTIVAR no no es fitotóxico, aplicado en los cultivos indicados y a las dosis recomendadas en esta ficha técnica. Según el momento y a la concentración aplicada, el producto puede provocar diversas reacciones en la mayoría de las plantas, por lo cual es recomendable seguir cuidadosamente las instrucciones y dosis indicadas; haga pequeñas pruebas antes de su empleo masivo en el cultivo, si existen dudas.

CONTRAINDICACIONES

Las soluciones conteniendo ACTIVAR ® son inestables en agua, por lo tanto, deben utilizarse dentro de las 24 horas siguientes después de la preparación. No aplicar cuando exista probabilidad de lluvia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Al emplear ACTIVAR ® no se requiere equipo de protección especial, por ser poco tóxico, sin embargo, al utilizarse en mezcla con otros productos, se recomienda seguir las indicaciones particulares de los mismos con que se mezcle. Evite el contacto, ingestión o inhalación del producto. Utilice el equipo de protección personal adecuado, durante la preparación de la mezcla de aspersión y la aplicación del producto: guantes, lentes de seguridad, overol, camisa de manga larga de algodón, botas de hule, gorra o sombrero.

LEA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES

- a) NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- b) NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.
- c) MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- d) LÁVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- e) NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.

EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO

ACTIVAR ® se envasa en frascos de 14 g

ACTIVAR ® es una marca registrada ante el Instituto de Revisión de Materiales Orgánicos

(OMRI por sus siglas en inglés) con el número nyc-8591.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU INGENIERO AGRÓNOMO ASESOR.

NAY-CHEM, S.A. de C.V. solamente se responsabiliza de la formulación correcta y el contenido neto del producto. Dado que el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de los productos, están fuera de nuestro control, NAY-CHEM, S.A. de C.V. no se hace responsable del uso y resultado de los mismos.

