



CABAL PLUS®

LÍQUIDO

COMP. GARANTIZADA	% EN PESO	COMP. GARANTIZADA	% EN PESO
Nitrógeno Total (N)	10.028	Magnesio (Mg)	0.027
Fósforo (P ₂ O ₅)	20.106	Manganeso (Mn)	0.043
Fósforo (K ₂ O)	5.089	Molibdeno (Mo)	0.006
Azufre (S)	3.705	Zinc (Zn)	0.057
Boro (B)	0.052	Ácido Húmico	0.514
Calcio (Ca)	0.038	Ácido Fúlvico	0.451
Cobre (Cu)	0.051	Folcisteina	0.389
Cobalto (Co)	0.003	Ácido indolacético	0.004
Hierro (Fe)	0.062	Acondicionadores y diluyentes	59.375
		Total	100.00

REG. RSCO-0093/VI/00

PUEDA SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

**SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN
UTILÍCESE EN LOS CULTIVOS Y A LAS DOSIS AQUÍ RECOMENDADAS**

CABAL PLUS® es un regulador de crecimiento líquido que contiene Auxinas, Folcisteina, NPK más elementos secundarios y micro elementos, complementado con Ácidos Húmicos y Fúlvicos. Esta formulación apoya en la germinación, el desarrollo radicular y vegetativo la floración, promueven la división celular, incrementan la tolerancia al estrés principalmente. Para utilizarse en aplicaciones al follaje, así como al suelo en fertirriego, siguiendo un programa de nutrición balanceado.

APLICACIÓN FOLIAR

CULTIVOS	DOSIS (L/Ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Ajo, cebolla.	2-3	Aplicar cada 15 días, a partir del estado de 6 hojas verdaderas.
Alfalfa, trébol, pastos.	2-3	Al inicio del desarrollo vegetativo o una semana después del corte.
Cereales.	1.5-2	Al inicio del amacollamiento y encañe.
Hortalizas de flor, tallos u hojas.	2-3	Una semana después de la emergencia o trasplante, aplicar cada quince días. Máximo 4 aplicaciones en el ciclo.
Frutales.	400-600 cc (por cada 100 L de agua)	Aplicar al inicio de la floración y al amarre de frutos.
Jícama, Papa.	2-3	Veinte días después de la emergencia, repetir cada 15 días. Máximo 4 aplicaciones.

APLICACIÓN EN FERTIRRIEGO

CULTIVOS	DOSIS (L/Ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Hortalizas	20 - 40	Aplicar al trasplante, dosis baja durante la etapa de floración. Repetir a los 21 días.
Frutales	40	Iniciar aplicación antes de la floración y al inicio de amarre de frutos.
Gramíneas	10 - 20	Iniciar aplicaciones una semana después de la siembra, repetir cada 15 días según necesidades.

FORMAS DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

En un recipiente realice una pre mezcla de **CABAL PLUS®** agitando levemente, posteriormente vacíe la pre mezcla en el tanque del equipo aspersor y complete después la cantidad de agua necesaria.

En aplicaciones al suelo, incluir **CABAL PLUS®** en el programa de fertirriego, tomando como base el análisis de suelo, para ajustar el número de aplicaciones necesarias por ciclo del cultivo.

COMPATIBILIDAD

CABAL PLUS® es compatible con la mayoría de los fertilizantes y plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de usarse.

CABAL PLUS® no se recomienda mezclarlo con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

CABAL PLUS® no es fitotóxico, aplicado en los cultivos indicados y a las dosis recomendadas en su etiqueta.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Observe estas advertencias de seguridad:

1. NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
2. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.
3. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
4. LÁVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
5. NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.

**EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO,
LLEVE A LA PERSONA CON EL MEDICO.**

CABAL PLUS® se envasa en presentaciones de 1L

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU INGENIERO AGRÓNOMO ASESOR.

NAY-CHEM, S.A. de C.V. solamente se responsabiliza de la formulación correcta y el contenido neto del producto. Dado que el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de los productos, están fuera de nuestro control, NAY-CHEM, S.A. de C.V. no se hace responsable del uso y resultado de los mismos.