

Fructy K

FERTILIZANTE FOLIAR POLVO SOLUBLE

FRUCTY K® es un fertilizante foliar en polvo soluble compuesto principalmente de Potasio (K) y Boro (B), complementado con Zinc (Zn). Por su contenido de Potasio, **FRUCTY K®** auxilia en los procesos tales como la activación de enzimas, la fotosíntesis, la síntesis de almidón y proteínas; por su contenido de Boro favorece el crecimiento y desarrollo de células nuevas, el desarrollo de semillas, la floración y la viabilidad de polen, principalmente.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% P/P
Potasio (K ₂ O)	55.08
Boro (B)	20.10
Zinc (Zn)	4.16
Acondicionadores	20.66
Total	100.00

REGISTRO: RSCO-0140/VIII/00

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS (L/HA)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
HORTALIZAS		
Brócoli, Chayote, Chile, Col, Coliflor, Fresa, Melón, Tomate, Pepino.	2 - 3	Aplicar al inicio de la floración y repetir a la formación de frutos.
	3 - 4	Aplicar durante el desarrollo de frutos cada 15 días.
Leguminosas: Cacahuete, Frijol, Frijol ejotero, Garbanzo, Haba, Soya.	1 - 2	Previo a la floración o al inicio de la formación de vainas.
	2 - 3	Aplicar durante la floración y la formación de vainas
Jícama, Papa.	2-3	Aplicar 15 días después de la siembra, repetir cada 15 días tres veces más.
GRANOS		
Gramíneas: Arroz, Avena, Cebada, Centeno, Maíz, Sorgo, Trigo. Ajonjolí, Cártamo	2 - 3	Aplicar al inicio de la formación de granos.
	3 - 4	Continuar a esta dosis a los 15 días posteriores según necesidades.
FRUTALES		
Aguacate, Berries (Arándano, Frambuesa, Zarzamora), Café, Cítricos (Limón persa, Limón mexicano, Naranja), Durazno, Guanábana, Guayaba, Mango, Papayo, Plátano.	2 - 3	Aplicar al inicio de la floración o la formación de frutos
	3 - 4	Al desarrollo de frutos repitiendo cada 15 a 21 días.

FORMAS DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

En un recipiente realice una pre mezcla del producto con un poco de agua, agregue la cantidad de **FRUCTY K®** a utilizar y agite. Vacíe la pre mezcla en el tanque del equipo aspersor y después la cantidad de agua necesaria. Utilice suficiente volumen de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje según sea en aplicación terrestre o rea, utilizando de 200 a 400 L en el primer tipo o alrededor de 50 L en el segundo tipo de aplicación.

COMPATIBILIDAD

FRUCTY K® es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de usarse. No es compatible con productos de fuerte reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico, aplicado en los cultivos indicados y a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Utilizar siempre el equipo de protección personal, cuando aplique este producto, dado que normalmente se emplea en combinación de otros productos fitosanitarios, por lo tanto, siga las indicaciones de seguridad durante su mezcla y aplicación.

FRUCTY K® se envasa en presentaciones de 1kg

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU INGENIERO AGRÓNOMO ASESOR.

NAY-CHEM, S.A. de C.V. solamente se responsabiliza de la formulación correcta y el contenido neto del producto. Dado que el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de los productos, están fuera de nuestro control, NAY-CHEM, S.A. de C.V. no se hace responsable del uso y resultado de los mismos.