

# Hormokin

## REGULADOR DE CRECIMIENTO VEGETAL. LÍQUIDO.

**HORMOKIN®** es un fito regulador de crecimiento de acción hormonal enriquecido con Calcio (Ca), vitaminas y aminoácidos que en conjunto estimulan el desarrollo de las plantas. Provocando el crecimiento de la planta por medio de la división, elongación y diferenciación celular, según el tipo de hormona.

Por su contenido **HORMOKIN®** actúa como un corrector de carencias del elemento Ca, importante en el desarrollo de hojas y raíces, forma además compuestos en las paredes celulares de la planta, la activación de procesos enzimáticos y contra restar el Sodio (Na) intercambiable en aguas o suelos con alto contenido de este mineral.

REG.: RSCO-00077/IV/00



**COMP. PORCENTUAL**  
Calcio (Ca)  
Citocininas (40 ppm)  
Auxinas (500ppm)  
Giberelinas (500ppm)  
Tiamina (500ppm)

**% P/P**  
10.0  
0.004  
0.05  
0.05  
0.05

**COMP. PORCENTUAL**  
Ácido Fólico (500ppm)  
Cisteína (1000ppm)  
Agente quelatante  
Acondicionadores y diluyentes  
Total

**% P/P**  
0.05  
0.10  
4.00  
85.696  
100.00

## RECOMENDACIONES TÉCNICAS

CULTIVOS	DOSIS (L/Ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Ajo, Cebolla.	1-2	En la etapa de 6 a 8 hojas, repetir cada 15 días.
Berenjena, Calabacita, Chile, Tomate, Pepino.	1	Al inicio de la floración y repetir cada 15 días.
Alfalfa.	1-2	Una semana después de cada corte.
Cacahuete.	1.5 -2	Aplicación a los 2 ó 3 meses después de la siembra.
Garbanzo, Frijol, Soya.	1-2	En etapa de botón floral y al inicio de la formación de vainas.
Acelga, Brócoli, Col, Coliflor, Lechuga, Espárrago.	1.5 -2	Etapa de 6-8 hojas verdaderas y repetir cada 21 días.
Jícama, Zanahoria.	1.5-2	En etapa de 4-6 hojas, repetir cada 15 días, según el ciclo.
Camote, Papa.	1-2	Aplicar 20 días después de la emergencia, repetir a los 20 a 30 días después.
Cítricos en general.	1-2	Aplicar al inicio de la floración, repetir según necesidades.
Piña, Plátano.	1	En una dilución de 1000 L, aplicar al inicio de la floración.
Nogal.	2	En una dilución de 1000 L, antes de la floración femenina, repetir a los 15 días después y 20 días después de la segunda aplicación.
Vid.	1	Al inicio de la floración y repetir al crecimiento de la baya.
Maíz, Sorgo, Trigo.		Aplicar en la etapa de 6-8 hojas verdaderas.

### FORMAS DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Vierta el producto a la dosis recomendada, directamente en el agua de aspersión, agitando levemente. Realice la aplicación por la mañana procurando cubrir bien el follaje, utilice de 200 a 400 L de agua por ha, en aplicaciones terrestres, y de 40 a 80 L en aplicaciones aéreas. **HORMOKIN®** puede ser empleado dentro de un programa de fertilización y/o fitosanitario, agregándolo primero al tanque de aspersión.

### COMPATIBILIDAD

**HORMOKIN®** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de usarse. El producto no es fitotóxico, aplicado en los cultivos indicados y a las dosis recomendadas en esta ficha técnica o en su etiqueta.

**HORMOKIN®** se envasa en presentaciones de 1 L

**PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU INGENIERO AGRÓNOMO ASESOR.**

NAY-CHEM, S.A. de C.V. solamente se responsabiliza de la formulación correcta y el contenido neto del producto. Dado que el manejo, transporte, almacenaje, dosificación y aplicación de los productos, están fuera de nuestro control, NAY-CHEM, S.A. de C.V. no se hace responsable del uso y resultado de los mismos.